

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Régisseur de recettes D.D.A.

Tél. 34-14-63 - Poste 93

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 3 au Bulletin n° 129 du mois de Juin.

22 Juin 1971

GRANDES CULTURES

POMMES DE TERRE

MILDIOU

Les études climatiques de ces derniers jours (pluviométrie et pourcentage d'humidité au niveau des cultures), nous permettent de préciser que nous sommes actuellement dans une période où de nouvelles contaminations de Mildiou sont possibles sur le feuillage.

Il est donc urgent de prévoir un nouveau traitement fongicide sur l'ensemble des cultures de la Circonscription. Ce traitement devrait être effectué avant le 25 Juin.

DORYPHORE

En cas de nécessité, ajouter un insecticide à la bouillie Mildiou (voir la liste en votre possession - rubrique Doryphore).

VIGNE

DESSECHEMENT DE LA RAFLE - BOTRYTIS

Les travaux menés par plusieurs chercheurs sur le Botrytis (Pourriture grise) et le Dessèchement de la rafle nous permettent de grands espoirs quant à la lutte contre ces affections dans les prochaines années.

Deux nouvelles matières actives viennent d'ailleurs d'obtenir une autorisation provisoire de vente. Il s'agit de la Dichlozoline (Sclex) et du Méthylthiophanate (Pelt 44).

Cependant, de nombreuses inconnues demeurent. De ce fait, nous considérons qu'il est prématuré de donner des avis de traitement.

Les études en cours, notamment en liaison avec l'I.T.V. à COLMAR, nous permettront de définir les époques favorables au développement du Botrytis dans nos vignobles. Aussi, nous pensons pouvoir préciser les dates d'application dès l'an prochain.

Actuellement, le Botrytis commence à apparaître sur feuilles et les premières manifestations de Pourriture de la rafle sont visibles.

Nous ne pouvons que recommander aux viticulteurs désireux de lutter contre le Botrytis, de suivre les indications diffusées par les fabricants.

ARBUSTES A PETITS FRUITS

OIDIUM AMERICAIN SUR GROSEILLIER A MAQUEREAU ET CASSISSIER

Des attaques d'Oïdium sont observées dans les plantations de cassissiers du TOULOIS, ainsi que dans quelques plantations du département du HAUT-RHIN.

.../...

Dans les cultures où la récolte n'est prévue que dans une dizaine de jours, on pourra intervenir dès à présent, avec le Bénomyl à 30 g de matière active à l'hectolitre ou avec le Dinocap à raison de 25 g de matière active à l'hectolitre, avec adjonction d'un mouillant.

En raison de son délai d'emploi avant la récolte (1 mois), le Drazoxolon ne pourra être utilisé qu'après la récolte.

Les premières manifestations se situant à l'intérieur des touffes, les traitements en pulvérisation pneumatique sont plus à recommander, car ils permettent d'atteindre toute la masse végétative.

En cas de pulvérisation classique, une forte pression est indispensable.

ANTHRACNOSE DU GROSEILLIER ET DU CASSISSIER

Les premiers symptômes sont visibles sur feuilles.

Immédiatement après la récolte, traiter avec un produit cuprique ou avec Mancozèbe à 160 g de M.A./hl.

CULTURES MARAICHERES

TOMATE

MILDIU

Les conditions climatiques actuelles sont également favorables au développement du Mildiou de la tomate. Traiter préventivement, dès que possible, avec l'un des produits suivants : Mancozèbe : 160 g/hl ; Manèbe : 160 g/hl ; Propinèbe : 210 g/hl.

POIS

TORDEUSE DU POIS

Les papillons sont en activité depuis quelques jours dans nos élevages. Seul, un traitement insecticide est à envisager sur les variétés tardives formant leurs premières gousses.

Le Diéthion à 1.000 g/ha ou la Phosalone à 600 g/ha, pourront être utilisés.

HARICOT

ANTHRACNOSE

L'Anthracnose se manifeste avec une certaine intensité. Afin de préserver les filets de cette maladie (taches noires), traiter toutes les variétés commençant à fleurir ainsi que celles ayant commencé la formation des premiers filets (consulter notre Bulletin n° 128 du mois de Mai).

CHOU

MOUCHE DU CHOU

Nous signalons que le deuxième vol de la Mouche du chou est amorcé. Les plantations de choux tardifs devraient faire l'objet d'un traitement insecticide, de préférence en arrosage des pieds au moment du repiquage. Se reporter à notre Note du 19 Avril.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :
C. GACHON et Ch. JANUS.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.

Dernière Note parue : Supplément n° 2 au Bulletin n° 129 publié en date du 16 Juin 1971.